8-800-555-09-09
www.setpol.ru

Подготовка пациента к процедуре сдачи мочи (Пушкино)

Сбор мочи для общего анализа в контейнер с консервантом

1. Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики. Перед

сбором мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет половых органов. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации.

2. Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1 - 2 секунды) выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора мочи, в который собрать приблизительно 50 мл мочи.

3. Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой. Доставьте пробирку с мочой в клинику в течение дня. Если нет возможности сразу доставить мочу, то пробирку с мочой следует хранить при температуре +2...+8°С.

4. После сбора мочи в стерильный контейнер (без консерванта), его необходимо доставить в лабораторию в течении 2х часов, если это невозможно, храните образец в холодильнике при температуре +2-+8 градусов не более 4-6 часов.